

БОРЩІВНИК Сосновського

НАДЗВИЧАЙНА
СИТУАЦІЯ +

Борщівник Сосновського – отруйна багаторічна рослина, сік якої, потрапляючи на шкіру людини, може викликати серйозні опіки з утворенням пухирів, які довго і складно гояться, а при значних ураженнях навіть потребують лікування у стаціонарі.

Це чужорідна для українських земель рослина. Він з'явився на наших теренах у 40-х роках ХХ століття. Його планували вирощувати на силос для корів. Однак дуже швидко стало зрозуміло, що корови його їдять неохоче, а їхнє молоко набуває неприємного присмаку. Вирощування борщівника згорнули, однак він почав безконтрольно розмножуватися, руйнуючи природні екосистеми.



Зараз в Україні можна зустріти 5 видів борщівника, деякі з них – неотруйні. Однак зовні вони подібні, тому їх легко сплутати.

Перша допомога

Якщо на шкіру потрапив сік борщівника,
дійте негайно



Ретельно промийте уражені ділянки шкіри проточною водою з милом



Наступні 2-4 дні не піддавайте шкіру дії прямих сонячних променів – одягайте закритий одяг



Якщо сік потрапив у очі чи в рот, промивайте їх водою протягом 15 хвилин, зверніться до лікаря

Заходи безпеки під час боротьби з борщівником

Під час боротьби з борщівником шляхом викошування (двічі на рік до початку цвітіння) чи використовуючи дозволені в Україні пестициди, необхідно вживати заходи для особистого захисту.

Захищайте шкіру довгим, бажано водонепроникним одягом, а руки – гумовими рукавичками.

Вдягайте окуляри, щоб запобігти потраплянню в очі соку та пилку рослин.

Використовуйте респіратор, якщо рослина вже цвіте. Пилок борщівника може серйозно подразнювати верхні дихальні шляхи, викликати алергічні реакції.